

## POMEMBNO SPOROČILO

Gospod \_\_\_\_\_ je bil danes, dne \_\_\_\_\_ na farmakodinamski doplerski ultrazvočni preiskavi. V kavernožno telo penisa smo vbrizgali vazokativno substanco, \_\_\_\_ $\mu$ g Caverjecta, ki v sicer **zelo redkih primerih, lahko povzroči dolgotrajnejšo erekcijo**. Če tako stimulirana erekcija traja **več kot 4 ure**, je **NUJEN pregled pri zdravniku**, najbolje urologu. Če erekcija traja preko 6 ur so možne trajne strukturne okvare kavernoznega tkiva in kasnejše poslabšanje erektilne disfunkcije.

### Navodilo za zdravnika

Začetno zdravljenje je aspiracija do skupaj 100 ml krvi iz kavernoznih teles.

Če ni uspeha je potrebno v kavernožno telo vbrizgati 1 ml raztopine adrenalina. Tak postopek lahko po nekaj minutnem presledku ponovimo večkrat, če v nekaj minutah po vbrizganju ne pride do uplahnitve spolnega uda. Če poseg ni uspešen je potrebna takojšnja intervencija urologa.

### Priprava raztopine:

1 ml ( ampula) adrenalina v 9 ml fiziološke raztopine ali 5% glukoze.

Način injiciranja: z najtanjšo iglo, vbod pravokotno na kožo , v centralni del desnega ali levega kavernoznega telesa. Posebna previdnost je zaradi systemskega učinka potrebna pri bolnikih s koronarno boleznijo, neurejeno arterijsko hipertenzijo in cerebralno ishemijo.

---